



湖南6月野生蘑菇中毒红黄绿警示



剧 毒

风险等级（Ⅰ级 风险高）

蘑界杀手No. 1-2：灰花纹鹅膏和裂皮鹅膏

损害类型：急性肝损害型（剧毒）

中毒危害：我们经常长在同一片森林中，被形象地称为蘑界“黑白无常”！

我省80%的蘑菇中毒死亡事件都是由我们完成。

我们的特点：头上带帽（菌盖），腰间系裙（菌环），脚上穿靴（菌托）



我是黑无常, 灰花纹鹅膏



夏天来了, 该咱们登场了!





湖南6月野生蘑菇中毒红黄绿警示



剧 毒

风险等级（Ⅰ级 风险高）

蘑界杀手No. 3：肉褐鳞环柄菇

损害类型：急性肝损害型（剧毒）

中毒危害：我是名副其实的小个子大“蘑”王！也是我省造成死亡最多的剧毒蘑菇之一。

识别要点：我小个子，头长草（鳞片），腿长毛（鳞片），松杉树下常见到。



松针满地！毒菇遍野！



湖南6月野生蘑菇中毒红黄绿警示



剧 毒

风险等级（Ⅱ级 风险较高）

蘑界杀手No. 4： 欧氏鹅膏

损害类型：急性肾衰竭型（剧毒）

中毒危害：我是急性肾衰竭型蘑菇中毒中最常见的物种！

识别要点：我与剧毒的肝损害型鹅膏类似，头上带帽（菌盖），腰间系裙（菌环），脚上穿靴（菌托）。

生长环境：我生于壳斗科林地上或以壳斗科和松科为主的混交林地上。



帽子-菌盖

裙子-菌环

靴子-菌托





湖南6月野生蘑菇中毒红黄绿警示



剧 毒


风险等级（Ⅱ级 风险较高）

磨界杀手No. 5： 假褐云斑鹅膏

损害类型：急性肾衰竭型，伴有心肌损伤（剧毒）

识别要点：我与剧毒的肝损害型鹅膏类似，头上带帽（菌盖），腰间系裙（菌环），脚上穿靴（菌托）。

生长环境：我常生于壳斗科林地上或以壳斗科和松科为主的混交林地上。





湖南6月野生蘑菇中毒红黄绿警示



剧 毒

风险等级（Ⅱ级 风险较高）

蘑界杀手No. 6：拟卵盖鹅膏

损害类型：急性肾衰竭型（剧毒）

中毒危害：我是急性肾衰竭型蘑菇中毒中最常见的物种！

识别要点：菌盖和菌柄基部被淡黄色至赭色、膜状或破布状的大块菌幕残余，菌盖边缘常悬垂白色至米色絮状物，菌盖和菌柄表面密被白色至米黄色粉末状鳞片，膜质菌环上位，易破碎消失。

生长环境：我常生于松科、壳斗科林地上或以松科和壳斗科为主的混交林地上。





湖南6月野生蘑菇中毒红黄绿警示



有毒

风险等级（Ⅱ级 风险较高）

磨界杀手No. 7：大青褶伞（青褶伞、铅绿褶菇）

损害类型：胃肠炎型（有毒）

中毒危害：我省中毒事件中最常见的毒蘑菇！

识别要点：我中等大小至大型，菌盖被褐色鳞片，菌褶成熟后铅绿色，菌柄上部具一类似戒指的菌环。

生长环境：我生长于草坪上、菜地里、路边草地荒地、锯末堆上，甚至是垃圾堆旁，是离人群最近的毒蘑菇！！！





湖南6月野生蘑菇中毒红黄绿警示



有毒

风险等级（Ⅱ级 风险较高）

蘑界杀手No. 8：日本红菇复合群

损害类型：胃肠炎型（有毒）

中毒危害：我是我省中毒事件中最常见的毒蘑菇！

识别要点：白蘑菇，小短腿，盖下凹，褶密排。

生长环境：我生长于阔叶树、针叶树或针阔混交林地上。





湖南6月野生蘑菇中毒红黄绿警示



有毒

风险等级（Ⅱ级 风险较高）

蘑界杀手No. 9：近江粉褶菌

损害类型：胃肠炎型（有毒）

中毒危害：我是我省中毒事件中最常见的毒蘑菇！

识别要点：小个子，戴斗笠，黄褐色，有细纹，褶粉红，细长腿。

生长环境：我常生于竹林或其他林中地上。





湖南6月野生蘑菇中毒红黄绿警示



有毒

风险等级（Ⅱ级 风险较高）

蘑界杀手No. 10：含异噁唑衍生物类毒素的鹅膏

主要包括球基鹅膏、残托鹅膏有环变型、环鳞鹅膏、土红鹅膏、小豹斑鹅膏、小毒蝇鹅膏

损害类型：神经精神型（有毒）

识别要点：我有鹅膏菌特点，另菌盖被鳞片，菌柄具菌环，基部膨大。





湖南6月野生蘑菇中毒红黄绿警示



风险等级（VI 级 风险较低）

无毒

红汁乳菇、靓丽乳菇：俗称枞菌、松菌、寒菌、雁鹅菌、重阳菌、铜锣菌、南风菌等，属菌根菌，是与马尾松等松类树种共生的一种菌根性美味食用菌。其风味独特、营养丰富，肉质脆味鲜美，被视为山中珍品。

红汁乳菇
可食



靓丽乳菇
可食